

## UTDRAG UR SOCIALSTYRELSENS FÖRESKRIFTER

Viss nackbehandling kan orsaka hjärnskador som kan medföra svår invaliditet eller död. De förekommer endast vid manipulation i halsryggraden.

Det är dock ovanligt med dessa skador



Den hastiga knycken av nacken kan orsaka en spasm i blodkärlen till hjärnan med bristningar i kärlets innervägg. Vanligast så uppstår besvären på en gång men kan vara fördröjd i ett par timmar.



I det skadade området kan det bildas proppar som lossnar och kan ge hjärnskador, och i värsta fall, leda till dödsfall. Besvären kan uppkomma flera dagar efter behandling.

Manipulationsbehandling av *barn under sexton års ålder får inte utföras* tills ytterligare kunskap om och erfarenhet av metoden finns. Efter *hänvisning av läkare* får dock barn i åldern *åtta t. o. m. femton* år behandlas med manipulation.

Barn och ungdomar är inte färdigvuxna och stabila i korsrygg och bäckenfogar. Särskilt flickor som utsätts för manipulation av bäckenlederna kan drabbas av framtida foglossningsbesvär.

Nästan 40 % av ryggfriska har buktande diskar i ländryggen. Vid manipulation kan utbuktningen pressas mot nerver och skapa förlämningsymtom. Skadorna är dock sällsynta.



**AXIS har ansvarsförsäkringar och följer Socialstyrelsens rekommendationer.**